

PEPTICATE & PEPTICATE PLUS

Vasslebaserat extensivt hydrolysat för barn med komjölksallergi

Pepticate (+ 0 mån) är en extensivt hydrolyserad, näringsmässigt komplett, vasslebaserad modersmjölksersättning i pulverform, för kostbehandling vid komjölksallergi. Hypoallergen. Innehåller laktos, ej lämplig för spädbarn med galaktosemi. Lämplig som enda näringskälla för spädbarn under 1 år, och som kosttillägg för barn över 1 år. Kompletteras med tilläggs kost från 6 månaders ålder i enlighet med sedvanlig introduktion till fast föda.

Pepticate PLUS (+ 6 mån) är en extensivt hydrolyserad, näringsmässigt komplett, vasslebaserad tillskottsnäring i pulverform, för kostbehandling vid komjölksallergi. Hypoallergen. Innehåller laktos, ej lämplig för spädbarn med galaktosemi. Lämplig som tillskottsnäring till bröstmjolk och/eller till en komjölksfri kost från 6-12 månaders ålder. Lämplig som tillskott till småbarn över 1 år.

Pepticate och Pepticate PLUS är livsmedel för speciella medicinska ändamål vid komjölksallergi, och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.



Näringsvärde		PEPTICATE		PEPTICATE PLUS	
		per 100 g pulver	Per 100 ml färdig lösning 13,6 g pulver + 90 ml vatten	per 100 g pulver	Per 100 ml färdig lösning 14,43 g pulver + 90 ml vatten
Energi	kJ	2024	276	1974	285
	kcal	484	66	471	68
Fett	g	24,7	3,4	22,3	3,2
(E%)		46	46	43	43
varav:					
- mättat fett	g	11,4	1,6	10,3	1,5
- MCT*	g	3,5	0,5	3,1	0,5
- enkelomättat fett	g	9,1	1,2	8,2	1,2
- fleromättat fett	g	4,2	0,6	3,8	0,5
- linolsyra (LA)	g	3,3	0,448	3,0	0,428
- α-linolensyra (ALA)	g	0,40	0,0543	0,36	0,0519
- Arakidonsyra (AA)	g	0,12	0,0165	0,12	0,0170
- Dokosaheksaensyra (DHA)	g	0,12	0,0165	0,12	0,0170
Förhållandet n6:n3		6,6:1	6,6:1	6,5:1	6,5:1
Kolhydrat	g	51,8	7,1	54,3	7,8
(E%)		43	43	46	46
varav:					
- sockerarter	g	25,5	3,5	25,2	3,6
- laktos	g	21,1	2,88	20,6	2,98
Fiber	g	4,0	0,5	3,9	0,6
(E%)		1	1	2	2
Protein	g	11,6	1,6	11,4	1,6
(E%)		10	10	9	9
Salt	g	0,38	0,05	0,38	0,06
Vitaminer					
Vitamin A	µg	426	58	416	60
Vitamin D	µg	12	1,7	12	1,7
Vitamin E	mg	10 (8,9 TE)	1,4 (1,2 TE)	9,5 (8,2 TE)	1,4 (1,2 TE)
Vitamin K	µg	33	4,4	31	4,5
Tiamin	mg	0,49	0,07	0,45	0,07
Riboflavin	mg	1,0	0,14	0,99	0,14
Niacin	mg	3,12 (6,4 NE)	0,426 (0,87 NE)	3,165 (6,4 NE)	0,457 (0,92 NE)
Pantotensyra	mg	4,2	0,573	3,857	0,557
Vitamin B6	mg	0,333	0,045	0,305	0,044
Folsyra	µg	64	8,7	59	8,5
Folat	µg	107	15	98	14
Vitamin B12	µg	1,2	0,16	1,1	0,16
Biotin	µg	14,0	1,9	13	1,8
Vitamin C	mg	67	9,1	59	8,5
Mineraler och spårämnen					
Natrium	mg	153	20,8	153	22,0
Kalium	mg	635	87	621	90
Klorid	mg	372	51	364	53
Kalcium	mg	444	61	546	79
Fosfor	mg	254	35	342	49
Magnesium	mg	37	5	52	7,6
Järn	mg	4,0	0,54	7,1	1
Zink	mg	4,9	0,66	4,7	0,68
Koppar	mg	0,381	0,052	0,369	0,053
Mangan	mg	0,057	0,008	0,046	0,007
Fluorid	µg	<44	<5,9	≤42	≤6,1
Molybden	µg	<44	<5,9	≤42	≤6,1
Selen	µg	22	3,0	22	3,1
Krom	µg	<44	<5,9	≤42	≤6,1
Jod	µg	92	13	90	13
Övrigt					
Kolin	mg	160	22	103	15
Inositol	mg	52	7,1	48	7
L-Karnitin	mg	15	2,1	14	2,0
Taurin	mg	39	5,30	35	5,1
Nukleotider	mg	17	2,30		
Osmolaritet	mOsmol/l	250	250	260	260
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	280	280	300	300

* MCT-fett baserat på total mängd C6-C12.

Ingredienser Pepticate

Vassleproteinhydrolysat (från **komjolk**), maltodextrin, vegetabiliska oljor (palmolja, kokosnötsolja, rapsolja, oljesyrarik solrosolja, solrosolja), galakto-oligosackarider (från **komjolk**), kalciumfosfat, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider citronsyrastrar), frukto-oligosackarider, **fiskolja**, kaliumklorid, olja från *Mortierella alpina*, kolinklorid, kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, L-tyrosin, L-askorbinsyra, inositol, magnesiumvätefosfat, taurin, natrium-L-askorbat, zinksulfat, L-karnitin, ferrosulfat, DL- α -tokoferylacetat, uridin-5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin-5'-monofosfat, kalcium-D-pantotenat, adenosin-5'-monofosfat, inosin-5'-monofosfatnatriumsalt, nikotinamid, guanosin-5'-monofosfatnatriumsalt, kopparsulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, mangansulfat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyra, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

Ingredienser Pepticate PLUS

Maltodextrin, vassleproteinhydrolysat (från **komjolk**), vegetabiliska oljor (palmolja, kokosnötsolja, rapsolja, oljesyrarik solrosolja, solrosolja), galakto-oligosackarider (från **komjolk**), kalciumfosfat, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider citronsyrastrar), frukto-oligosackarider, **fiskolja**, kaliumklorid, magnesiumvätefosfat, olja från *Mortierella alpina*, natriumklorid, kolinklorid, L-tyrosin, L-askorbinsyra, inositol, taurin, natrium-L-askorbat, ferrosulfat, zinksulfat, L-karnitin, natriumcitrat, DL- α -tokoferylacetat, uridin-5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin-5'-monofosfat, kalcium-D-pantotenat, adenosin-5'-monofosfat, inosin-5'-monofosfatnatriumsalt, nikotinamid, guanosin-5'-monofosfatnatriumsalt, kopparsulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyra, mangansulfat, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

Spädning

För varje skopa tillsätts 30 ml vatten för att uppnå rekommenderad koncentration. (Skopvikt Pepticate: 4,5 g. Pepticate PLUS: 4,8 g.)

Tillredning

Modersmjölksersättning/tillskottsnäring i pulverform är inte steril. Pepticate/Pepticate PLUS skall därför tillredas strax innan matningstillfället och inte varmhållas längre än 15 minuter före användning. Koka ej blandningen och använd ej mikrovågsugn för att tillreda eller värma upp den. Använd en nappflaska eller shaker för att blanda modersmjölksersättning/tillskottsnäringen.

1. För att undvika kontamination, tvätta händerna och använd alltid väl rengjorda hushållsredskap vid tillredningen. Koka nappflaska och napp innan användning (att koka/sterilisera nappflaskan är inte nödvändigt när barnet börjar äta fast mat).
2. Koka vatten från kallvattenkranen och låt svalna något. Häll önskad mängd av det varma men inte heta vattnet i den väl rengjorda nappflaskan/shakern.
3. Fyll skopan med Pepticate/Pepticate PLUS och jämna till ytan med en kniv. Pressa inte ner pulvret i skopan. Använd skopan som finns med i burken för rätt dosering.
4. Tillsätt rekommenderat antal skopor av Pepticate/Pepticate PLUS till vattnet. Sätt fast flaskans/shakerns lock ordentligt och skaka tills att pulvret löst sig väl.
5. Kontrollera lösningens temperatur innan matningen genom att hålla en droppe på insidan av din handled. Om blandningen är för varm kan du kyla flaskan i kallvatten.
6. All överbliven lösning äldre än en timme skall slängas. Varmhåll inte.

TILLREDNING AV MÅLTID – PEPTICATE

Ungefärlig ålder	Ungefärlig kroppsvikt kg	Antal skopor 1 skopa = 4,5 g	Avsvalnat kokt vatten ml	Antal måltider per dygn*
0–14 dagar	3,5	3	90	6
2–8 veckor	4,0	4	120	6
2–3 månader	5,0	6	180	5
4–5 månader	6,5	7	210	5
6–7 månader	7,5	7	210	4
8–12 månader	9,0	8	240	3

TILLREDNING AV MÅLTID – PEPTICATE PLUS

Ungefärlig ålder	Ungefärlig kroppsvikt kg	Antal skopor 1 skopa = 4,8 g	Avsvalnat kokt vatten ml	Antal måltider per dygn*
6–7 månader	7,5	7	210	4
8–12 månader	9	8	240	3

*måltider per dygn är endast vägledande.

Hållbarhet och förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Öppnad burk bör förslutas väl och användas inom en månad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Beställning

Produkterna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Förpackning
Pepticate	90 04 93	1 burk à 450 g
Pepticate	90 04 99	6 burkar à 450 g
Pepticate PLUS	69 10 92	1 burk à 450 g

Pepticate och Pepticate PLUS är förskrivningsbara på livsmedelsanvisning för barn under 16 år. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjolk är den bästa födan för spädbarnet.