

SOUVENAID


Kostbehandling av patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom

Souvenaid är en näringsdryck för kostbehandling av patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.

Souvenaid innehåller Fortasyn Connect™ – en kombination av näringsämnen som är utformad för att möta de specifika näringsbehov som föreligger hos personer med tidig Alzheimers sjukdom genom att stimulera synapsbildning.^{1,2}

Fortasyn Connect™ består av omega-3 fleromättade fettsyror från fiskolja, uridin-monofosfat och kolin, tillsammans med fosfolipider, B-vitaminer och andra näringsämnen i mängder som är svåra att uppnå med vanlig kost.

Souvenaid är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.



Ingredienser

Vatten, maltodextrin, sackaros, **fiskolja**, **komjölksprotein**, uridin 5-monofosfatdinatrium-salt, aromer (cappuccino, vanilj, jordgubb), stabiliseringsmedel (mikrokristallinsk cellulosa, natrium-karboximetylcellulosa), kolinklorid, kaliumcitrat, sojalecitin, surhetsreglerande medel (citronsyra), natrium-L-askorbat, kaliumcitrat, färgämne (sockerkulör^a, kurkumin^b, karmin^c), DL- α -tokeferylacetat, magnesiumhydroxid, natriumcitrat, kaliumhydroxid, järnlaktat, zinksulfat, pyridoxinhydroklorid, kopparglukonat, nikotinamid, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra, tiaminhydroklorid, retinylacetat, riboflavin, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdate, kaliumjod, fytomenadion, D-biotin, cyanokobalamin, kolekalciferol.

a) Endast i cappuccinosmak b) Endast i vaniljsmak c) Endast i jordgubbsmak

Souvenaid innehåller per 100 ml

- 102 kcal
- 2,6 g protein från mjölkprotein (10E%)
- 4,3 g fett från fiskolja (39E%)
- 12,6 g kolhydrater från maltodextrin och sackaros (50E%)

Låglaktos, glutenfri, halal.

Indikation

Souvenaid är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som kostbehandling i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Används på inrådan av hälso- och sjukvårdspersonal.

Souvenaid har en kliniskt dokumenterad minnesförbättrande effekt hos patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom efter minst 12 veckor.³⁻⁵ Långtidsstudier med Souvenaid (36 månader) har visat positiva effekter på kognition, funktion, hjärnatrofi och sjukdomsprogression hos patienter i ett tidigt stadium av Alzheimer sjukdom.⁶

Användning

Souvenaid är färdig att dricka och serveras lämpligen väl kyld. Omskakas väl innan användning. Souvenaid får inte värmas, förpackas eller blandas med andra drycker. Inga interaktioner med läkemedel har observerats.⁵

Dosering

En flaska Souvenaid 125 ml per dag, om inte de näringsmässiga behov som föreligger vid tidig Alzheimer sjukdom kan uppnås med vanlig mat. Souvenaid är ej lämplig som enda näringskälla. Ej avsedd för sondmatning.

Hållbarhet och förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp i högst 24 timmar. Bäst före-datum anges på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad samt förpackad i en skyddande atmosfär.

Beställning

Souvenaid kan köpas på apotek eller via nätapoteket Apotea, www.apotea.se. I några landsting finns det möjlighet att förskriva Souvenaid på landstingsbidrag. Egenavgiften varierar mellan de olika landstingen.

Produkt	Art.nr	Förpackning
Souvenaid Cappuccinosmak	90 04 53	4 x 125 ml
Souvenaid Jordgubbsmak	90 03 07	4 x 125 ml
Souvenaid Vaniljsmak	90 03 53	4 x 125 ml

Näringsvärde		Per 100 ml	Per 125 ml
Energi	kJ	426	525
	kcal	102	125
Fett (39 E%)	g	4,3	4,9
Varav:			
- Mättade	g	1,5	1,6
- Enlekomättade	g	0,95	1,19
- Fleomättade	g	1,8	1,9
- EPA	mg	240	300
- DHA	mg	960	1200
Kolhydrat (50 E%)	g	12,6 (12,4 ^a)	16,5 (16,8 ^a)
- varav laktos	g	<0,025	<0,025
Fiber (1 E%)	g	0,6	0,7
Protein (10 E%)	g	2,6	3,8
Salt	g	0,25	0,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg	160	200
Vitamin D3	µg	0,80 (0,70 ^a)	1,0 (0,88 ^a)
Vitamin E	mg- α -TE/ET	32	40
Vitamin K	µg	6,17	6,6
Vitamin C	mg	64	80
Tiamin (B1)	mg	0,15	0,19
Riboflavin (B2)	mg	0,17	0,2
Niacin	mg (mg NE)	1,06 (1,8)	1,3 (2,3)
Pantotensyra	mg	0,53	0,66
Vitamin B6	mg	0,80	1,0
Folsyra	µg	320	400
Vitamin B12	µg	2,4	3,0
Biotin	µg	4,0	5,0
Mineraler			
Natrium	mg	100	125
Kalium	mg	100 (150 ^a)	125 (188 ^a)
Klorid	mg	115 (125 ^a)	145 (156 ^a)
Kalcium	mg	80	100
Fosfor	mg	79	88
Magnesium	mg	20	25
Järn	mg	1,6	2,0
Zink	mg	1,2	1,6
Koppar	mg	0,18	0,23
Mangan	mg	0,33	0,41
Molybden	µg	10	12,5
Selen	µg	48	60
Krom	µg	6,8 (6,7 ^a)	8,5 (8,4 ^a)
Jod	µg	16 (13 ^a)	20 (16,3 ^a)
Övriga näringsämnen			
UMP (Uridin-5-monofosfat)	mg	500	625
Kolin	mg	320	400
Osmolaritet	mOsmol/l	441 (497 ^a , 427 ^b)	
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	524 (585 ^a , 506 ^b)	
Surhetsgrad	pH	6,3 (6,2 ^a)	
Vattenhalt	ml	85 (84 ^a)	106 (105 ^a)

a) Cappuccinosmak b) Vaniljsmak

Referenser:

1. Wurtman RJ et al. Nutritional Modifiers of Aging Brain Function: Use of Uridine and Other Phosphatide Precursors to Increase Formation of Brain Synapses. *Nutr Rev* 2010;68 Suppl 2(Suppl 2):S88-S101. (review) 2. van Wijk N et al. Targeting synaptic dysfunction in Alzheimer's disease by administering a specific nutrient combination. *J Alzheimers Dis* 2014;38: 459-479. 3. Scheltens P et al. Efficacy of a medical food in mild Alzheimer's disease: A randomized, controlled trial. *Alzheimers Dement* 2010;6: 1-10 e11. 4. Scheltens P et al. Efficacy of Souvenaid in mild Alzheimer's disease: Results from a randomized, controlled trial. *J Alzheimers Dis* 2012;31: 225-236. 5. Olde-Rikkert MGM et al. Tolerability and Safety of Souvenaid in Patients With Mild Alzheimer's Disease: Results of Multi-Center, 24-week, Open-Label Extension Study. *JAD* 2015;44:471-480. 6. Soininen H et al. 36-month LipiDiDiet multinutrient clinical trial in prodromal Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis* 2020;1-12. DOI: 10.1002/alz.12172