

# NEOCATE SYNEO

**För kostbehandling av spädbarn och barn med komjölksallergi, sojaallergi, malabsorption eller multipel födoämnesallergi.**

**Neocate Syneo** är en aminosyrabaserad näringsmässigt komplett modersmjölkser-sättning avsedd för kostbehandling av spädbarn från födseln till 12 månader. Innehåller frukto-oligosackarider, Bifidobacterium breve M-16V, långkedjiga fettsyror (LCP) och nukleotider.

**Neocateprodukterna** är hypoallergena specialnäringar där proteinet består av 100% fria aminosyror.

Neocate Syneo är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.



## Ingredienser

Torkad glukossirap, raffinerade vegetabiliska oljor (oljesyrarik solrosolja, medellånga fettsyror (kokosnöt och/eller palmolja), rapsolja, solrosolja), fiber (oligofruktos (sc-FOS), inulin (lc-FOS)), L-arginin-L-aspartat, L-leucin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-prolin, L-valin, emulgeringsmedel (E472c), L-isoleucin, glycin, L-treonin, dikalciumvätefosfat, L-fenylalanin, L-tyrosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, dibasisk kalciumfosfat, trikaliumcitrat, natriumklorid, kalciumkarbonat, kolinbitartrat, L-cystin, kalciumglycerofosfat, L-tryptofan, kalciumcitrat, magnesiumklorid, L-metionin, olja från *Cryptocodium cohnii*, kalciumfosfat (tribasisk), olja från *Mortierella alpina*, magnesium-L-aspartat, inositol, L-askorbinsyra, antioxidationsmedel (solroslecitin, askorbylpalmitat), taurin, Bifidobacterium breve M-16V, ferrosulfat, zinksulfat, L-karnitin, DL- $\alpha$ -tokoferylacetat, uridin 5'-monofosfat-natriumsalt, cytidin-5'-monofosfat, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, inosin-5'-monofosfatnatriumsalt, adenosin-5'-monofosfat, guanosin-5'-monofosfatnatriumsalt, kopparsulfat, tiaminmononitrat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, retinylacetat, kaliumjodid, mangansulfat, pteroylmonglutaminsyra, fytomenadion, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

## Tillredning

1. Tvätta händerna och rengör arbetsytan. Använd väl rengjorda redskap.
2. Koka vatten från kallvattenkranen och låt svalna tills vattnet känns ljust mot handleden. Håll önskad mängd vatten i en väl rengjord nappflaska.
3. Fyll den medlagda skopan med Neocate Syneo och jämna till ytan med en ren och torr kniv. Pressa inte ner pulvret.
4. Tillsätt rekommenderat antal skopor av Neocate Syneo till vattnet. Sätt på flaskans kork och skaka kraftigt tills pulvret löst sig.
5. Kontrollera lösningens temperatur innan matningen genom att hålla en droppe på insidan av din handled.
6. Modersmjölksersättning i pulverform är inte steril. Neocate Syneo skall därför användas omedelbart efter tillredning. Överbliven näringkasseras inom en timme efter tillredning.

## Viktigt

Ska inte kokas. Ska inte tillredas i mikrovågsugn. Syneopulvret får ej överstiga 40 grader då detta minskar nyttan av Bifidobacterium breve M-16V. Ej lämplig som sondnäring direkt till tarmen. Ej lämplig för prematura, immunosupprimerade spädbarn, spädbarn med central venkateter eller korttarmssyndrom. Lämplig som enda näringsskälla för spädbarn under 1 år. *Neocate Syneo är ej för parenteralt bruk.*

## Dosering

Använd den mängd och spädning som ordinerats av läkare eller dietist. Använd endast medföljande skopa för rätt dosering. 1 skopa = 4,8 g.

| Vatten | Pulver   | Slutvolym, ca |
|--------|----------|---------------|
| 30 ml  | 1 skopa  | 35 ml         |
| 90 ml  | 3 skopor | 100 ml        |
| 180 ml | 6 skopor | 200 ml        |

## Hållbarhet och förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Öppnad burk bör förslutas väl och användas inom två veckor.

## Beställning

Produkterna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutriciastore.se](http://www.nutriciastore.se), e-post: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30.

| Produkt       | Art.nr   | Förpackning    |
|---------------|----------|----------------|
| Neocate Syneo | 90 04 87 | 1 burk à 400 g |

Neocate Syneo är förskrivningsbar på livsmedelsanvisning för barn under 16 år. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjolk är den bästa födan för spädbarnet.

## Näringsvärde

|                                 |                               | Per 100 g pulver | Per 100 ml 14,4% spädning |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Energi</b>                   | <div>kJ</div> <div>kcal</div> | 1985             | 286                       |
| <b>Fett (45 E%)</b>             | g                             | 23,6             | 3,4                       |
| varav:                          |                               |                  |                           |
| - mättat fett                   | g                             | 10,5             | 1,5                       |
| - MCT*                          | g                             | 7,4              | 1,1                       |
| - enkelomättat fett             | g                             | 9,3              | 1,3                       |
| - fleromättat fett              | g                             | 3,8              | 0,55                      |
| - linolsyra (LA)                | g                             | 3,09             | 0,445                     |
| - $\alpha$ -linolensyra (ALA)   | g                             | 0,31             | 0,045                     |
| - arakidonsyra (AA)             | g                             | 0,12             | 0,0171                    |
| - dokosaheksaensyra (DHA)       | g                             | 0,12             | 0,0171                    |
| Förhållandet n6:n3              | 1/5,6                         |                  |                           |
| <b>Kolhydrat (42 E%)</b>        | g                             | 50,2             | 7,2                       |
| varav:                          |                               |                  |                           |
| - sockerarter                   | g                             | 4,7              | 0,67                      |
| <b>Fiber (2 E%)</b>             | g                             | 4,5              | 0,64                      |
| <b>Proteinekvaliter (11 E%)</b> | g                             | 13,2             | 1,9                       |
| <b>Salt</b>                     | g                             | 0,53             | 0,08                      |
| <b>Vitaminer</b>                |                               |                  |                           |
| Vitamin A                       | $\mu$ g                       | 415              | 59,7                      |
| Vitamin D                       | $\mu$ g                       | 11,4             | 1,64                      |
| Vitamin E                       | mg                            | 10,6 (9,48 TE)   | 1,52 (1,37 TE)            |
| Vitamin C                       | mg                            | 50,7             | 7,31                      |
| Vitamin K                       | $\mu$ g                       | 42,8             | 6,17                      |
| Tiamin                          | mg                            | 0,57             | 0,08                      |
| Riboflavin                      | mg                            | 0,6              | 0,08                      |
| Niacin                          | mg                            | 3,94 (9,25 NE)   | 0,57 (1,33 NE)            |
| Vitamin B6                      | mg                            | 0,46             | 0,07                      |
| Folsyra                         | $\mu$ g                       | 66,0             | 9,51                      |
| Folat                           | $\mu$ g                       | 110              | 15,8                      |
| Vitamin B12                     | $\mu$ g                       | 1,33             | 0,19                      |
| Biotin                          | $\mu$ g                       | 18,5             | 2,66                      |
| Pantotensyra                    | mg                            | 2,94             | 0,42                      |
| <b>Mineraler och spårämnen</b>  |                               |                  |                           |
| Natrium                         | mg                            | 209              | 30,0                      |
| Kalium                          | mg                            | 520              | 74,8                      |
| Klorid                          | mg                            | 378              | 54,4                      |
| Kalcium                         | mg                            | 550              | 79,2                      |
| Fosfor                          | mg                            | 358              | 51,5                      |
| Magnesium                       | mg                            | 50,0             | 7,20                      |
| Järn                            | mg                            | 7,11             | 1,02                      |
| Koppar                          | mg                            | 0,40             | 0,058                     |
| Zink                            | mg                            | 5,19             | 0,75                      |
| Mangan                          | mg                            | 0,047            | 0,007                     |
| Jod                             | $\mu$ g                       | 99,6             | 14,3                      |
| Molybden                        | $\mu$ g                       | 10,9             | 1,57                      |
| Selen                           | $\mu$ g                       | 18,0             | 2,59                      |
| Krom                            | $\mu$ g                       | 10,4             | 1,50                      |
| <b>Övrigt</b>                   |                               |                  |                           |
| Kolin                           | mg                            | 132              | 19,0                      |
| Inositol                        | mg                            | 106              | 15,3                      |
| L-Karnitin                      | mg                            | 9,49             | 1,37                      |
| Taurin                          | mg                            | 30,8             | 4,44                      |
| Nukleotider                     | mg                            | 16,6             | 2,39                      |
| Osmolalitet                     | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O    |                  | 360                       |

\* MCT-fett baserat på total mängd C6-C12.

Serumnivåer av mikronutrient, speciellt fosfor bör monitoreras rutinmässigt när Neocate används som primär eller enda näringsskälla för patienter med komplex systemisk sjukdom som involverar flera diagnoser och tarmsjukdom<sup>a)</sup> särskilt i kombination med sondmatning och/eller en historik av prematuritet. Neocate<sup>b)</sup> används i samråd med medicinsk personal.

a) En retrospektiv fallstudie identifierade patienter med aminosyrarönsning som total eller huvudsaklig nutrition med diagnoser från flera organsystem såsom kongenitala gastrointestinala anomalier och GI kirurgi (såsom nekrotiserande enterokolit, esofagal atresi, trakeoesofagal fistula); neurologiska sjukdomar (såsom krampor, intraventrikulär hemorragi, hydrocephalus); sjukdom i andningsvägarna (såsom lungsjukdom, trakeostomi, aspiration); kongenital hjärtsjukdom; och andra systemiska tillstånd, ofta i samband med sondmatning och/eller en historik av prematuritet.

b) Neocate är aminosyrabaserade ersättningar för kostbehandling av mjölkallergi, multipel födoämnesallergi och relaterade gastrointestinala och allergiska tillstånd där aminosyrarönsning är indikerat.