

PEPTICATE SYNEO 1 & PEPTICATE SYNEO 2

Vasslebaserat extensivt hydrolyserat med pre- och probiotika, för barn med komjölsallergi

Pepticate Syneo 1 (0-6 mån) är en extensivt hydrolyserad, vasslebaserad specialnäring för kostbehandling av komjölsallergi. Näringsmässigt komplett från födseln och som tillägg för barn över 1 år. Hypoallergen. Innehåller Bifidobacterium breve M-16V och prebiotisk blandning av GOS/FOS och HMO 2'-FL.* Kompletteras med tilläggsrost från 6 månaders ålder i enlighet med sedvanlig introduktion till fast föda.

Pepticate Syneo 2 (+6 mån) är en extensivt hydrolyserad, vasslebaserad specialnäring för kostbehandling av komjölsallergi. Lämplig som enda näringskälla eller som tillskott till en komjölsfri kost för spädbarn från 6 till 12 månader, och som tillägg för barn över 1 år. Hypoallergen. Innehåller Bifidobacterium breve M-16V och prebiotisk blandning av GOS/FOS och HMO 2'-FL.*

* Strukturellt identiskt med 2'-FL i bröstmjolk, ej från bröstmjolk.

Pepticate Syneo är livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av komjölsallergi, och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.



Näringsvärde		PEPTICATE SYNEO 1		PEPTICATE SYNEO 2	
		per 100 g pulver	Per 100 ml färdig lösning 13,66 g pulver + 90 ml vatten	per 100 g pulver	Per 100 ml färdig lösning 14,44 g pulver + 90 ml vatten
Energi	kJ	1990	272	1941	280
	kcal	475	65	463	67
Fett	g	24,7	3,4	22,3	3,2
(E%)		46	46	43	43
varav:					
- mättat fett	g	11,4	1,6	10,3	1,5
- MCT*	g	3,5	0,5	3,1	0,5
- enkelomättat fett	g	9,1	1,2	8,2	1,2
- fleromättat fett	g	4,2	0,6	3,8	0,5
- linolsyra (LA)	g	3,3	0,448	3,0	0,429
- α-linolensyra (ALA)	g	0,40	0,0543	0,36	0,0519
- Arakidonsyra (AA)	g	0,12	0,0165	0,12	0,0171
- Dokosaheksaensyra (DHA)	g	0,12	0,0165	0,12	0,0171
Kolhydrat	g	51,7	7,1	54,2	7,8
(E%)		43	43	46	46
varav:					
- sockerarter	g	25,5	3,5	25,2	3,6
- laktos	g	21,1	2,89	20,6	2,98
Fiber	g	4,1	0,6	3,9	0,6
(E%)		1	1	1	1
varav:					
- 2'-fukosyllaktos	g	0,15	0,02	0,15	0,02
Protein	g	11,7	1,6	11,4	1,6
(E%)		10	10	9	9
Salt	g	0,38	0,05	0,38	0,06
Vitaminer					
Vitamin A	µg	426	58	416	60
Vitamin D	µg	12	1,7	12	1,7
Vitamin E	mg	10 (8,9 TE)	1,4 (1,2 TE)	9,5 (8,2 TE)	1,4 (1,2 TE)
Vitamin K	µg	33	4,4	31	4,5
Tiamin	mg	0,49	0,07	0,45	0,07
Riboflavin	mg	1,0	0,14	0,99	0,14
Niacin	mg	3,12 (6,4 NE)	0,426 (0,88 NE)	3,165 (6,4 NE)	0,457 (0,92 NE)
Pantotensyra	mg	4,2	0,574	3,9	0,56
Vitamin B6	mg	0,333	0,045	0,305	0,044
Folsyra	µg	64	8,8	59	8,5
Folat	µg	107	15	98	14
Vitamin B12	µg	1,2	0,16	1,1	0,16
Biotin	µg	14,0	1,9	13	1,8
Vitamin C	mg	67	9,1	59	8,5
Mineraler och spårämnen					
Natrium	mg	153	20,9	153	22,1
Kalium	mg	635	87	621	90
Klorid	mg	373	51	364	53
Kalcium	mg	444	61	546	79
Fosfor	mg	254	35	343	49
Magnesium	mg	37	5,0	52	7,6
Järn	mg	4,0	0,54	7,1	1,0
Zink	mg	4,9	0,66	4,7	0,68
Koppar	mg	0,381	0,052	0,369	0,053
Mangan	mg	0,057	0,008	0,046	0,007
Fluorid	µg	<43	<5,9	≤42	≤6,1
Molybden	µg	<43	<5,9	≤42	≤6,1
Selen	µg	22	3,0	22	3,1
Krom	µg	<43	<5,9	≤42	≤6,1
Jod	µg	92	13	90	13
Övrigt					
Kolin	mg	160	22	103	15
Inositol	mg	52	7,1	48	7
L-Karnitin	mg	15	2,1	14	2,0
Taurin	mg	39	5,3	35	5,1
Osmolaritet	mOsmol/l	250	250	260	260
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	280	280	300	300

* MCT-fett baserat på total mängd C6-C12.

Ingredienser Pepticate Syneo 1

Vassleproteinhydrolysat (från komjölk), maltodextrin, vegetabiliska oljor (palmolja, kokosnötsolja, rapsolja, solrosolja med hög andel oljesyra, solrosolja), galakto-oligosackarider (från komjölk), kalciumfosfat, emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyrastrar), fruktooligosackarider, fiskolja, kaliumklorid, olja från *Mortierella alpina*, kolinklorid, kaliumcitrat, natriumklorid, 2'-fukosyllaktos, magnesiumklorid, Ltyrosin, L-askorbinsyra, inositol, magnesiumvätefosfat, taurin, natrium-Laskorbat, Bifidobacterium breve M-16V, zinksulfat, L-karnitin, järnsulfat, DL- α -tokoferylacetat, uridin-5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin-5'-monofosfat, kalcium-D-pantotenat, adenosin-5'-monofosfat, inosin-5'-monofosfatnatriumsalt, nikotinamid, guanosin-5'-monofosfatnatriumsalt, kopparsulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, mangansulfat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyra, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

Ingredienser Pepticate Syneo 2

Maltodextrin, vassleproteinhydrolysat (från komjölk), vegetabiliska oljor (palmolja, kokosnötsolja, rapsolja, oljesyrarik solrosolja, solrosolja), galakto-oligosackarider (från komjölk), kalciumfosfat, emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyrastrar), fruktooligosackarider, fiskolja, kaliumklorid, magnesiumvätefosfat, olja från *Mortierella alpina*, natriumklorid, 2'-fukosyllaktos, kolinklorid, L-tyrosin, Laskorbinsyra, inositol, taurin, natrium-Laskorbat, Bifidobacterium breve M-16V, järnsulfat, zinksulfat, L-karnitin, natriumcitrat, DL- α -tokoferylacetat, uridin-5'-monofosfatnatriumsalt, cytidin-5'-monofosfat, kalcium-D-pantotenat, adenosin-5'-monofosfat, inosin-5'-monofosfatnatriumsalt, nikotinamid, guanosin-5'-monofosfatnatriumsalt, kopparsulfat, DL- α -tokoferol, retinylpalmitat, riboflavin, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyra, mangansulfat, retinylacetat, natriumselenit, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

Spädning

För varje skopa tillsätts 30 ml vatten för att uppnå rekommenderad koncentration. (Skopvikt Pepticate Syneo 1: 4,6 g. Pepticate Syneo 2: 4,8 g.)

Tillredning

Specialnäring i pulverform är inte steril. Pepticate Syneo 1 och Pepticate Syneo 2 ska därför tillredas omedelbart innan matningstillfället. Näringen ska inte kokas.* Använd inte mikrovågsugn för tillredning eller uppvärmning. Använd en nappflaska eller shaker för att blanda specialnäringen.

1. Tvätta händerna noga och rengör arbetsytan. Sterilisera flaskor och nappar.
2. Koka kallt, färskt vatten i 5 minuter eller tills en vattenkokare slår av. Häll avsedd mängd vatten i den steriliserade flaskan, sätt på locket och låt svalna. Kontrollera lösningens temperatur så att den känns ljummen genom att hålla en droppe på insidan av din handled.
3. Fyll den bifogade skopan med pulver och jämna till ytan med en ren och torr kniv. Pressa inte ner pulvret i skopan. Använd endast skopan som finns bifogad i burken.
4. Tillsätt ordinerat antal skopor av pulvret till vattnet. Sätt på locket till flaskan och skaka tills pulvret har löst sig. Före matning, säkerställ att näringen har lämplig temperatur genom att hålla några droppar på insidan av din handled.
5. Använd omedelbart efter tillredning. Släng all näring som blivit över efter två timmar. Värm inte upp näringen igen under matningstillfället.

*Syneopulvret får ej överstiga 40° då detta minskar nyttan av Bifidobacterium breve M-16V.

TILLREDNING AV MÅLTID - PEPTICATE SYNEO 1

Barnets vikt (kg)	Antal skopor 1 skopa = 4,6 g	Avsvalnat kokt vatten (ml)	Antal måltider per dygn
3,5	3	90	6-8
4,0	4	120	6
5,0	6	180	5
6,5	7	210	5
7,5	7	210	4
9,0	8	240	3

TILLREDNING AV MÅLTID - PEPTICATE SYNEO 2

Barnets vikt (kg)	Antal skopor 1 skopa = 4,8 g	Avsvalnat kokt vatten (ml)	Antal måltider per dygn
7,5	7	210	4
9,0	8	240	3

Tabellerna är endast vägledande. Dosering och spädning ska alltid fastställas i samråd med läkare eller dietist och är beroende av barnets ålder, vikt och kliniska tillstånd.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur (ej i kylskåp). Sätt alltid på burkens lock och förslut väl efter användning. Öppnad förpackning skall förbrukas inom en månad. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Viktigt

Endast för enteral användning. Får ej användas parenteralt. Bröstmjolk är bästa födan för ett spädbarn. Ska användas under medicinsk övervakning och endast efter beaktande av övrig kostbehandling, inklusive amning. Pepticate Syneo 1 och Pepticate Syneo 2 innehåller *Bifidobacterium breve* och är ej lämplig för prematura spädbarn eller spädbarn som är immunosupprimerade. Rekommenderas ej för spädbarn med central venkateter eller korttarmssyndrom, såvida inte en läkarbedömning av klinisk risk och nytta föreligger, samt att patienten därefter monitoreras. Pepticate Syneo 1 och Pepticate Syneo 2 innehåller laktos: ej lämplig för spädbarn med galaktosemi.

Beställning

Produkterna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Förpackning
Pepticate Syneo 1	90 08 57	1 burk à 400 g
Pepticate Syneo 2	90 08 58	1 burk à 400 g

Pepticate Syneo 1 och Pepticate Syneo 2 är förskrivningsbara på livsmedelsanvisning för barn under 16 år. Nutricia stöder WHO-koden att bröstmjolk är den bästa födan för spädbarnet.